

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan judul hubungan tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap penggunaan kombinasi obat allopurinol dan antinyeri pada swamedikasi penyakit *gout*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan kategori cukup mengenai penggunaan obat *gout* yaitu sebanyak 43 responden (43%), sedangkan tingkat pengetahuan kategori baik sebanyak 36 responden (36%) dan tingkat pengetahuan kategori kurang sebanyak 21 responden (21%).
2. Sebagian besar responden memiliki sikap kategori cukup terhadap penggunaan obat *gout* yaitu sebanyak 84 responden (84%), sedangkan sikap kategori baik sebanyak 13 responden (13%) dan sikap kategori kurang sebanyak 3 responden (3%).
3. Hasil uji *chi-square* menunjukkan nilai *p-value* 0,144 ($p > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan sikap terhadap penggunaan obat *gout* pada swamedikasi di Apotek Tarandam Kota Padang.
4. Hasil uji *chi-square* menunjukkan nilai *p-value* 0,093 ($p > 0,05$), sehingga tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan karakteristik sosiodemografi tertentu terhadap penggunaan obat *gout* pada swamedikasi di Apotek Tarandam Kota Padang.

5. Hasil uji *chi-square* menunjukkan nilai *p-value* 0,872 ($p > 0,05$), sehingga tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dengan karakteristik sosiodemografi tertentu terhadap penggunaan obat *gout* pada swamedikasi di Apotek Tarandam Kota Padang.

5.2 Saran

1. bagi masyarakat diharapkan lebih aktif mencari informasi yang benar mengenai penggunaan obat *gout* agar dapat melakukan swamedikasi secara tepat dan aman.
2. Bagi apotek diharapkan meningkatkan pemberian informasi dan edukasi mengenai penggunaan obat *gout*, khususnya allopurinol dan obat antinyeri.
3. Bagi tenaga kesehatan diharapkan lebih aktif memberikan konseling dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan obat *gout* yang rasional.
4. Bagi penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah sampel yang lebih besar dan menambahkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap penggunaan obat *gout*.