

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Karakteristik pasien tukak diabetikum di RSUP Dr. M. Djamil Padang didominasi oleh perempuan sebanyak 58 pasien, sedangkan berdasarkan kelompok usia didominasi oleh pasien berusia >60 tahun sebanyak 58 pasien.
2. Profil penggunaan antibiotik pada pasien tukak diabetikum menunjukkan adanya terapi tunggal dan kombinasi. Penggunaan antibiotik kombinasi tidak selalu berarti seluruh antibiotik diberikan secara bersamaan, tetapi dapat merupakan perubahan atau pergantian regimen selama masa perawatan sesuai kondisi dan evaluasi pasien
3. Penggunaan antibiotik berdasarkan status amputasi dan nonamputasi menunjukkan adanya kesamaan jenis antibiotik pada kedua kelompok, terutama ampicilin-sulbaktam, gentamisin, metronidazol, dan sefiksime. Kesamaan tersebut berkaitan dengan adanya diagnosis yang serupa, terutama ulkus dan gangren, sehingga status amputasi bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan penggunaan antibiotik.

5.2 Saran

1. Bagi RSUP Dr. M. Djamil Padang, disarankan untuk melakukan evaluasi penggunaan antibiotik secara berkala pada pasien tukak diabetikum serta meningkatkan pemantauan terhadap penggunaan antibiotik tunggal maupun

kombinasi, termasuk perubahan atau pergantian regimen selama masa perawatan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan data rekam medis yang lebih lengkap, terutama mengenai riwayat pemberian antibiotik selama masa perawatan, sehingga penggunaan antibiotik pada pasien tukak diabetikum dapat digambarkan dengan lebih jelas.

